

# 大動脈解離(スタンフォードB)で入院された方へ ( 様 )

	入院当日( 月 日)	入院2日目( 月 日)	入院3日目( 月 日)	入院4日目( 月 日)
<b>目標</b>	1. 胸部症状が出現したら、すぐに医師、看護師に伝えられる。 2. 指示された安静が守れる。 3. 病気の経過が理解できる。	1. 胸部症状が出現したら、すぐに医師、看護師に伝えられる。 2. 指示された安静が守れる。 3. 病気の経過が理解できる。	1. 胸部症状が出現したら、すぐに医師、看護師に伝えられる。 2. 指示された安静が守れる。 3. 病気の経過が理解できる。	1. 胸部症状が出現したら、すぐに医師、看護師に伝えられる。 2. 指示された安静が守れる。
<b>内服・注射</b>	点滴があります。 24時間持続です。  内服があります。 看護師がお持ちします。 	点滴があります。 24時間持続です。  内服があります。 	点滴があります。 24時間持続です。  内服があります。 	点滴があります。 24時間持続です。  内服があります。 
<b>検査</b>	・鼻粘膜検査 ・血糖値検査	・血液検査 ・血糖値検査 ・尿検査 ・レントゲン  	・血液検査 ・血糖値検査 	・血液検査 ・血糖値検査 ・レントゲン  
<b>処置</b>	手首の動脈に常時血圧を測定する。 管を入れます。		手首の動脈の管を抜きます。	
<b>食事</b>	食事は食べられません。 水分摂取量は確認します。 	昼から食事開始 心臓高血圧食(塩分7gの制限食) 水分摂取量は確認します。	心臓高血圧食(塩分7gの制限食) 水分摂取量は確認します。 	心臓高血圧食(塩分7gの制限食) 水分摂取量は確認します。 
<b>安静</b>	心臓リハビリテーション開始 ベッド上安静です。 看護師と一緒に身体の向きを変えます。	ベッドアップ30度まで可 	ベッドアップ90度まで可 	自力座位まで可 →
<b>排泄</b>	おしっこの管が入っています。 排便時は便器を使用します。			→
<b>清潔</b>	朝・昼・夕に蒸しタオルで顔を拭きます。 歯磨きと髭剃りをします。	蒸しタオルで体を拭きます。 		蒸しタオルで体を拭きます。 
<b>説明</b>	医師より病気・治療についての説明があります。 入院生活についての説明があります。	病気や生活上の注意事項について説明があります。 		

※これはあくまでも予定です。場合によっては予定通りに経過しないこともありますのでご了承ください。