

水頭症 VPシャント術 で入院された方へ

(様)

	手術前	手術当日	手術1日目	手術2日目	手術3日目	手術4~6日目	手術7~9日目
	/	/	/	/	/	/~/	/~/
目標	手術の必要性が理解できる	手術が受けられる	痛みが軽減する	症状の悪化がない	症状が安定する	症状が安定する	症状が安定する
内服	内服している処方を見せてください	絶食のため内服中止	食事とともに再開 	内服を再開	→		
注射	なし	手術後より点滴があります	点滴があります 	点滴があります 	点滴があります 		
検査	手術のための検査があります		XP・CT検査があります				
処置	(医師の指示があれば剃毛)		頭部に管が入っています	ガーゼ交換をします			創部の抜鉤があります
食事	夕食後より絶食		昼食より食事再開 	→			
安静	症状に合わせ説明します		ベット上安静				回診時許可があれば歩行できます
排泄		術後より尿の管が入ります	→			→	病状に合わせて尿の管を抜きます
清潔	清拭・シャワー 		全身清拭 	全身清拭 			首下シャワー 
説明	手術の書類にサインをして下さい	術後、医師より説明があります					病状についての説明があります

※これはあくまでも予定です。場合によっては予定通りにいかない事もありますので御了承ください。

福井県立病院 脳神経外科 2014年9月改訂