



腹部動脈検査および肝動脈塞栓療法(TAE)を受けられる方へ

患者番号:

患者氏名:

様

日付	前日	治療当日		術後1日目	2~5日目
		治療前	治療後		
目標	治療の注意点について理解できる	治療の注意点について理解できる	術後の安静指示を守る 痛みがある場合には、看護師に伝えられ鎮痛剤の使用で痛みが軽減できる	痛みが軽減できる	痛みが軽減できる
内服	通常通り内服してください ※ワーファリンなどの抗凝固剤の内服は医師の指示に従ってください	朝は内服してください 昼の内服は中止してください	食事と共に、お薬も再開して下さい ※ワーファリンなどの抗凝固剤の内服は医師の指示に従ってください	通常どおりです	通常どおりです
注射		左手に点滴をします	点滴があります 	点滴があります	点滴があります
検査				早朝採血をすることもあります	
処置	血栓予防の為の弾性ストッキングをお渡しします	弾性ストッキングを着用し、病衣のガウンに着替えます	術後心電図モニター、酸素を付けます 帰室後時間毎に体温・脈拍。血圧を測ります 穿刺部位の出血の観察確認をします 安静解除後、問題なければ心電図モニター、酸素投与を外します 	穿刺部のガーゼ交換を行います 数日間抗生剤の点滴をすることがあります	
食事	通常通りです	朝食は通常どおりです。朝食終了後、絶飲食となります 	帰室後より水・お茶が飲めます 治療2時間後より吐き気などなければ夕食を食べられます。夕食はおにぎりになっております。 	通常通りです	
安静	制限はありません	制限はありませんが、なるべく病室で待機してください	※治療後の安静は大変重要です ご協力下さい 医師の診察(圧迫解除)までは上を向いた姿勢で穿刺した側の足を曲げたりしないでください。苦痛の強いときには体位を変えることも出来ますので、遠慮せずお知らせ下さい 医師の診察後は歩行できます。術後初めて歩行される場合は看護師見守ります ナースコールでお知らせ下さい	制限はありません	制限はありません
排泄	制限はありません	尿の管を入れます	医師の診察(圧迫解除)後にトイレ歩行の許可が出たら尿の管を抜きます	制限はありません	制限はありません
清潔	入浴をしてください		術後シャワー浴及び入浴は出来ません	熱がなければシャワー浴が出来ます	
説明	タオル1枚・バスタオル2枚・T字帯もしくはオムツを準備してください 同意書を提出してください	ご家族の方は来院お願いします			

※これはあくまでも予定です。場合によっては予定通りにいかないこともありますので、ご了承ください。 福井県立病院 消化器内科 腹部動脈検査および肝動脈塞栓療法(TAE)を受けられる方へ 2016年7月改訂