

体外衝撃波結石破碎術を受けられる方へ

患者番号:

患者氏名:

様

aa

手術日

2015年1月1日

日付	手術前日 (12/31)		手術当日(1/1)		手術後1日目 (1/2)
	術前		術中	術後	
目標	①結石がくだける ②排石を促すことができる				
内服	21時に下剤を飲んでいただきます				
注射		午前中から点滴を始めます 入室前に筋肉注射をします		点滴終了後、針を抜きます	
検査				碎石の経過を見るために腹部のレントゲン検査があります	
処置	<ul style="list-style-type: none"> 体外衝撃波結石破碎術とは、身体の外から結石に対して衝撃波を当て、砂状に細かく砕く治療法です 砂状となった結石は、尿と共に身体の外に排泄されます 治療は麻酔なしで行われ、多くは1時間くらいで終わります(副作用や後遺症はほとんどありません) レントゲン室で手術を行います(結石が大きい場合は再治療となります) 				
食事	<ul style="list-style-type: none"> 特に制限はありません 糖尿病などの持病のある方は治療食となります 		→	<ul style="list-style-type: none"> 帰室後より水分が飲めます 水分を500ml以上摂取して下さい。 	<ul style="list-style-type: none"> 特に制限はありません 水分は1日1000ml以上摂取して下さい
安静	病院内は自由です	<ul style="list-style-type: none"> 筋肉注射後は、ベッド上で安静にしてください 車椅子で治療に行きます 	<ul style="list-style-type: none"> 医師、看護師が説明する体位です(あお向け又は腹ばい) 	<ul style="list-style-type: none"> 車椅子でお部屋へ戻ります その後病院内の歩行は自由です 	病院内の歩行は自由です
排泄				トイレに袋が準備してあります。(集石網つき)その中へ尿を入れてください。集石用網に排石があれば申し出てください。	
清潔	入浴できます	入浴できません			入浴できます
説明					
その他	手術後の感染予防と肺炎予防のために、入院が決まったその日から禁煙をお願いします	<ul style="list-style-type: none"> 血尿の続くことがあります、心配はいりません。ただし①血尿が濃くなる時②発熱時③痛みが強いときは、外来へ連絡ください。 日常生活に特に制限はありませんが、水分を1日1000ml以上とりましょう 排石があり、採取できれば、次回受診日に持参してください 心配なことがあれば、日中は泌尿器科外来、夜間は救急外来へご相談ください 			

福井県立病院 TEL0776-54-5151

※これはあくまでも予定です。場合によっては予定通りにいかないこともありますので、ご了承ください。

福井県立病院 体外衝撃波結石破碎術を受けられる方へ 2016年9月改訂