


リツキサン+化学療法15日間で入院された方へ

患者番号:
患者氏名:
様

aa

日付	入院日 (1/1)	入院2日目 (1/2)	入院3日目 (1/3)	入院4日目 (1/4)	入院5日目～入院8日目 (1/5～1/8)	入院9日目 (1/9)	入院10日目～退院 (1/10～)
目標	治療の内容が理解できる	点滴が問題なく終了できる			日常生活の注意点がわかる 感染予防の対策についてわかる	点滴が問題なく終了できる	退院後の注意事項がわかる
内服	持参薬があるときは看護師にお見せ下さい		プレドニンを5日間内服します。 イメントを3日間内服します。(患者さんにより服用しない場合もあります)			点滴前に副作用止めの内服があります。	
注射		抗がん剤の点滴があります		白血球を上げる注射をします		リツキサンの点滴があります	熱が出た場合は、抗生素の点滴をします
検査	採血 胸部レントゲン 心電図		リツキサン前日には採血があります				適宜採血があります
処置						点滴投与のための針を挿入します。	
食事		特に制限はありません。何を食べていただいて結構です。(制限がある方もいます) 食欲がないときなどは、病院の食事を変更できます。看護師にご相談ください。					
安静			特に制限はありません。				
排泄			排便回数や排便性状を確認しましょう。便秘をする場合は、下剤で調整しましょう。				
清潔			点滴日(入院2日目・9日目)にシャワー浴希望される方は、9時30分までにすませてください。				
説明	治療前に薬剤師から説明があります。					点滴中は血圧や体温をこまめに測ります。	

※これはあくまでも予定です。場合によっては予定通りにいかない事もありますので御了承ください。 福井県立病院 血液腫瘍内科 リツキサン+化学療法15日間で入院された方へ 2016年9月改訂