





日付	1日目	2日目	3日目	4～8日目	9日目	16日目	退院日
目標	治療の内容が理解出来る	点滴が問題なく終了できる	点滴が問題なく終了できる	副作用をすぐに報告できる	点滴が問題なく終了できる	点滴が問題なく終了できる	退院後の注意事項がわかる
内服	持参薬があるときは看護師に見せてください。	点滴の前後で副作用を抑える内服薬があります。 4、5日目に吐き気止め、だるさ防止の内服薬があります。					
注射	点滴の説明があります。	ガザイバとベンダムスチンの2剤があります。	ベンダムスチンの点滴があります。	4日目にジールスタ（白血球を増やす薬）の皮下注射があります。	ガザイバの点滴があります。	ガザイバの点滴があります。	
検査	採血。 胸部レントゲン。 心電図。 	適時採血があります。					
処置	 点滴投与のための針を挿入します。 点滴中は心電図モニターを装着します。 点滴中痛みがある場合は、温罨法や点滴の量を増やして対応します。						
食事	特に制限はありません。何を食べていただいても結構です（制限がある方もいます）。 食欲がないときは、病院の食事を変更できます。看護師にご相談ください。 初日に栄養士からの食事指導があります。						
活動	特に制限はありません。	点滴に差し支えのない程度であればかまいません。					
排泄	排便回数や排便性状を確認しましょう。便秘をする場合は下剤で調整しましょう。						感染予防のためにうがい、手洗いなどに努めましょう。
清潔	点滴日にシャワー浴をされる方は、点滴の時間は避けて下さい。 感染予防のためにうがい、手洗いなどに努めましょう。						
説明	治療前に薬剤師から説明があります。	血管炎、過敏症など副作用について説明があります。	発熱性好中球減少症、血小板減少についての説明があります。				退院後の生活や緊急時の対応の説明をします。
		吐き気があるときには吐き気止めを使用します。					
※これはあくまでも予定です。場合によっては予定通りにいかないこともありますので、ご了承ください。 福井県立病院 血液腫瘍内科 ガザイバ+ベンダムスチン療法で入院された方へ 2024年10月作成							
主治医名		担当医名					
管理栄養士		栄養管理の必要性 あり					
上記について説明を受けました		署名		ご本人以外の場合患者様とのご関係（ ）			