



















シスプラチン/ティーエスワ

レジメンカード (名称: 短時間CDDP(60mg/m²)/S-1<3投2休>)

患者名: _____

1クール: 35日

月/日	/ ~ /	/	/	/	/	/ ~ /	
開始日よりの日数	1~7	8	9	10	11	12~21	22~35
<点滴>							
		メイン	側管				
アロキシバッグ 50ml デカドロン 吐き気・倦怠感防止	30分						
ソルデム1 500mL 硫酸マグネシウム 補液	60分						
ソルデム1 500mL 塩化カリウム 補液	60分						
アプレピタントカプセル(125mg) 吐き気防止 2本目のソルデム1と同時に内服	内服 1カプセル						
フロセミド注「タイヨー」 利尿剤	シスプラチン 投与 30分前						
生食 500mL 68mg シスプラチン注「日医工」(約80%量) 治療薬②	60分						
ソルデム1 500mL 塩化カリウム 補液	60分						
ソルデム1 500mL 塩化カリウム 補液	60分						
総点滴時間(めやす)		6時間					
<内服>							
エスワン 治療薬① 40mg/回	1日2回 朝・夕 食後		21日間(3週間)内服して、 14日間(2週間)休薬します				
お薬の数、色は患者さんによって異なります							
アプレピタントカプセル(80mg) 吐き気防止	1日1回 朝食後 1カプセル		朝食後 				
デカドロン錠 吐き気・倦怠感防止	1日1回 朝食後 8mg						

胃がん術前 1クール目(2クール予定)
副作用: 便秘grade2

担当医	看護師	薬剤師