










気管支喘息で入院された方へ

(様)

	1日目(/)	2日目(/)	3日目(/)	4日目(/)	5日目(/)	6日目(/)	7日目(/)
目標	息づらさがない(軽減する) 吸入を続けることが出来る		活動範囲が広がる。		酸素吸入がなくても息づらさがない。		
内服	<input type="checkbox"/> ステロイドの内服をします。 (内服できない場合は注射をします)		→  →		→	→	→
注射	<input type="checkbox"/> 抗生物質の点滴を行います(必要に応じて)。 <input type="checkbox"/> ステロイドの注射をします(内服できない場合)。 <input type="checkbox"/> 持続点滴をします(食事が取れない場合)。 						
検査	<input type="checkbox"/> 胸部レントゲン <input type="checkbox"/> 採血	<input type="checkbox"/> 血糖測定(朝1回)		<input type="checkbox"/> 胸部レントゲン (必要時)			<input type="checkbox"/> 胸部CT (必要時)
処置	<input type="checkbox"/> 吸入:1日6回(4時間毎) →発作時は吸入を追加します <input type="checkbox"/> 酸素吸入(必要時) 		<input type="checkbox"/> 吸入:1日4回(6時間毎) →発作が無ければ吸入は終了します。				
食事	特に制限はありません。 →食事は変更できますので、希望があれば看護師にお知らせください。						
安静	ベッド上安静です。 	呼吸がつかなくなれば 室内歩行できます。		酸素がはずれば、病棟内を歩けます。 (動いたりすることで苦しくなる時は、安静が必要です)			
排泄	尿器を使用もしくは 尿道に管が入ります。	呼吸がつかなくなれば室内トイレを使用できます。					
清潔		蒸しタオルで 体を拭きます。 	医師の許可があれば、シャワーができます。				
説明	主治医より、病状・治療方針について、説明があります。 看護師より入院生活について説明があります。		薬剤師より、 薬の説明があります。 		入院費については 都度ご確認ください。 		薬剤師より、 薬の説明があります。

※これはあくまでも予定です。場合によっては予定通りにいかない事もありますので御了承ください。