

急性心筋梗塞で入院された方へ

(

) 様

	入院当日(月 日)	入院2日目(月 日)	入院3日目(月 日)	入院4日目(月 日)	入院5日目(月 日)
目標	1. 胸部症状が出現したら、すぐに医師、看護師に伝えられる 2. 安静が守れる 3. 疑問や不安が言える 4. 内服が飲める	1. 胸部症状が出現したら、すぐに医師、看護師に伝えられる 2. リハビリができる 3. 疑問や不安が言える 4. 内服が飲める	1. 胸部症状が出現したら、すぐに医師、看護師に伝えられる 2. リハビリで端座位になれる 3. 内服が飲める	1. 胸部症状が出現したら、すぐに医師、看護師に伝えられる 2. リハビリで立位になれる 3. 内服が飲める	1. 胸部症状が出現したら、すぐに医師、看護師に伝えられる 2. リハビリで20m歩行ができる 3. 内服が飲める 4. 一般病棟に転棟できる
内服・注射	点滴があります(24時間持続)。 内服があります(看護師がお持ちします)。 ・抗凝固剤 				
検査	・心電図 ・血液検査 ・レントゲン ・鼻粘膜検査  血糖値測定(6時・14時・22時)	・心電図 ・血液検査 ・レントゲン  血糖値測定(6時・14時・22時)	・心電図 ・血液検査 ・レントゲン  血糖値測定(朝食前または毎食前)	・心電図  血糖値測定(朝食前または毎食前)	・心電図  血糖値測定(朝食前または毎食前)
処置	・腕の穿刺部位を圧迫帯で固定して います。2時間毎に圧迫をゆるめます。 ★穿刺側の手は強く曲げたり力を入れないでください。 ★シビレや出血がある場合は看護師にお伝え下さい。 ★足の付け根に管が入っています。足を曲げないようにして下さい。	手の圧迫帯を取って絆創膏を貼ります。 ・(首・足のつけね)の管を 抜き絆創膏を貼ります。	・(首・足のつけね)の管を 抜き絆創膏を貼ります。		
食事	食事は食べられません。 水分は摂取できます。  水分摂取量は確認します	食事は食べられません。 水分は摂取できます。 水分摂取量は確認します 	食事が開始になります。 心臓高血圧食 (塩分7g コレステロール250g) 	心臓高血圧食 (塩分7g コレステロール250g)	心臓高血圧食 (塩分7g コレステロール250g)
安静	水分摂取量は確認します ベッドアップ30度まで可 看護師と一緒に身体の向きを 変えます。 	心臓リハビリテーション開始 ベッドアップ90度まで可  ・テレビをみたり読書をすることができます。	端座位まで可 	立位まで可 	室内歩行可 20m歩行訓練をします。 
排泄	安静と尿量確認のためにおしこの管が入っています。 便は寝たまま便器でします。				おしこの管を抜きます。 便はポータブルトイレでします。
清潔	朝・昼・夕に蒸しタオルで顔を拭きます。 歯磨きと髭剃りをします。	蒸しタオルで体を拭きます。 		蒸しタオルで体を拭きます。 	
説明	医師より病気・治療についての説明 があります。  看護師より入院生活についての説明があります。	リハビリ指導士から、リハビリについて の説明があります。 			一般病棟に転棟します。 車椅子で移動します。

※これはあくまでも予定です。場合によっては予定通りに経過しないこともありますのでご了承ください。