




シスプラチンショートハイドレーション療法で  
入院された方へ

入院診療計画書

患者番号:

患者氏名:

様

日付	入院日	入院2日目	入院3日目	入院4日目	入院5日目	入院6日目	退院日	
目標	尿量測定の意味と方法が理解できる	抗癌剤の血管外漏出がない	1000mlの水分が摂取できる		外来化学療法室での注意事項を理解できる			
		尿量が確保できる	飲水の意味と必要性が理解できる		退院後の生活の注意点が理解できる			
		重大な副作用がない						
内服	現在飲んでいるお薬を確認します	点滴前に吐き気止めを内服	・入院3日目・4日目の朝食後に吐き気止め ・入院3日目～5日目の朝食後にステロイドの内服があります					
注射		入院2日目に抗癌剤の点滴があります						
検査	採血、レントゲン、心電図検査があります			採血があります			退院日に採血あります	
処置		抗癌剤投与前の体重(基準体重)より1.5Kg体重増加が見られる場合は、利尿剤を内服します						
		基準体重	朝食前の体重	朝食前の体重				朝食前の体重
		Kg		Kg				Kg
		点滴終了して1時間後の体重						
	Kg							
食事	特に制限はありません。医師の指示により制限がある方もいます							
活動	特に制限はありません。医師の指示により制限がある方もいます							
排泄		①点滴開始前に必ず排尿 ②点滴中は1時間に1回は必ず排尿し、尿量を測定 ③点滴終了して1時間後にも必ず排尿						
清潔	入院2日目(点滴日)に入浴希望される方は10時までに入浴をすませてください。その他は制限はありません							
説明	・尿量測定の方法について説明します ・抗がん剤について薬剤師より説明があります	水分摂取の必要性について説明します						

・この表はあくまで予定です。予定通りにいかないこともありますので、ご了承ください。 福井県立病院 消化器内科・血液腫瘍内科 シスプラチンショートハイドレーション療法で入院された方へ 2024年8月改訂

主治医名	担当医名	主治医以外の担当者: 看護師
管理栄養士	栄養管理の必要性 あり	
上記について説明を受けました	署名	ご本人以外の場合患者様とのご関係( )