

ベージニオ 服薬情報提供書（トレーシングレポート）

報告日： 年 月 日

福井県立病院

乳腺外科

御中

患者氏名

患者ID

生年月日

※初回処方の場合は、内服開始後2、3日を目安にフォローアップをお願いします。

担当医

処方箋発行日

保険薬局名

薬剤師氏名

住 所

電 話 番 号

F A X 番 号

☐ この情報を伝えることに對して同意を得た

聞き取り日： 月 日

聞き取り相手：☐本人 ☐家族 ☐その他（ ）

聞き取り方：☐対面 ☐電話 ☐その他（ ）

アドヒアランス

☐良好 ☐不良（ ）

副作用モニタリング（有害事象共通用語基準v5.0）

※当てはまる状態にチェックをお願いします

Grade		発現時期	1	2	3
発熱	なし	月 日から	37.5～39℃ ¹⁾	39～40℃	>40℃
呼吸困難	なし	月 日から	中等度の労作に伴う息切れ	極めて軽度の労作に伴う息切れ	安静時の労作に伴う息切れ
咳嗽	なし	月 日から	市販の医薬品を要する	身の回り以外の日常生活動作の制限 ²⁾	身の回りの日常生活動作の制限 ³⁾
倦怠感	なし	月 日から	だるさがある または元気がない	身の回り以外の日常動作を制限するだるさがある ²⁾	身の回りの日常生活動作を制限するだるさがある ³⁾
下痢	なし	月 日から	普段より1～3回／日 多い	普段より4～6回／日 多い	普段より7回／日以上 多い
悪心	なし	月 日から	吐き気はあったが 食事摂取量は変わらず	吐き気で食事量が減った	吐き気で 食事が摂れない

1)発熱の有害事象共通用語基準v5.0 Grade1・38℃→37.5℃へ変更

2)身の回り以外の日常生活動作とは、食事の準備、日用品や衣服の買い物、電話の使用、金銭の管理などをさす。

3)身の回りの日常生活動作とは、入浴、着衣・脱衣、食事の摂取、トイレの使用、薬の内服が可能で、寝たきりではない状態をさす。

※色がついている部分に該当した場合、患者様に外来へのご相談を促してください。

TEL：0776-54-5151(代) <月～金 8：30～17:00> がん相談支援センターへ <それ以外の時間外> 救急外来へ

・その他気になる症状や副作用

・副作用に関する具体的な内容や指示した対応法

・次回外来時の希望内容

※この情報伝達は疑義照会ではありません

↑ FAX送信：福井県立病院 薬剤部 ↑

0776-52-6488