


当日入院不安定狭心症経皮的冠動脈インターベンションで入院された方へ

患者番号:

患者氏名:

様

日付	検査当日		翌日	2日目(退院日)
	検査前	検査後		
目標	治療の予定がわかる 治療への不安なことが言える 注意事項が守られる 針をさす部位がわかる	胸部症状がない 異常な出血がない 針をさした部位の痛みや腫れがない	胸部症状がない 異常な出血がない 針をさした部位の痛みや腫れがない	胸部症状がない 針をさした部位の痛みや腫れがない
内服	内服薬は医師より指示があります	→	内服が変更になる場合があります	
注射	入院後点滴を開始します	点滴は、翌朝まで続きます	医師の診察後点滴を抜きます	
検査	医師の指示で検査があります	心電図検査をします	午前中に心電図検査をします	
処置	治療は、()時からです 針は()より刺します	心電図モニターを装着します 手から手術をされた場合圧迫は、少しずつゆるめます	→ 退院可能な方は、朝の診察時に外します 引き続き治療が必要な方は、心電図モニターを続けます	
食事	水分を300ml以上飲みましょう 食事はできません	水分は、すぐに飲めます 2時間たてば、食事ができます 夜は、おにぎり食です	朝まで、おにぎり食です	
安静	室内安静です	室内安静です 足からカテーテルされた方はベッド上安静です	病棟内安静です	
排泄	必要な方に尿の管を入れます		尿の管が入っている方は、医師の診察後に抜きます	
清潔	入浴できません		夕方より軽くシャワーができます	入浴できます
説明	家族の方は、治療30分前に来院し、病室でお待ちください 治療中はカテーテ室の前でお待ちください	家族の方といっしょに、治療結果を聞いてください	退院後の生活について説明があります	

※これはあくまでも予定です。場合によっては予定通りにいかないこともありますので、ご了承ください。 福井県立病院 循環器内科 当日入院不安定狭心症経皮的冠動脈インターベンションで入院された方へ