



	前日	治療当日		術後1日目	2日目
		治療前	治療後		
目標	治療の注意点について理解できる 	治療の注意点について理解できる	<ul style="list-style-type: none"> 術後の安静指示を守れる 痛みがある場合には、看護師に伝えられ鎮痛剤の使用で痛みが軽減できる 	痛みがある場合には、鎮痛剤の使用で痛みが軽減できる	痛みがある場合には、鎮痛剤の使用で痛みが軽減できる
内服	<ul style="list-style-type: none"> 通常通り内服してください ※ワーファリンなどの抗凝固剤の内服は医師の指示に従ってください 	<ul style="list-style-type: none"> 朝は内服してください 昼の内服は中止してください 	<ul style="list-style-type: none"> 食事と共に、お薬も再開して下さい ※ワーファリンなどの抗凝固剤の内服は医師の指示に従ってください 	・通常通りです	・通常通りです
注射		・左手に点滴をします		・点滴があります	・点滴があります
検査				・朝採血があります	
処置	・血栓予防の為の弾性ストッキングをお渡しします	・弾性ストッキングを着用します	<ul style="list-style-type: none"> 術後心電図モニターを付けます 帰宅後時間毎に体温・脈拍。血圧を測ります 穿刺部位の出血の観察確認をします 	<ul style="list-style-type: none"> 主治医の診察後、問題なければ心電図モニター・弾性ストッキングを外せます 	
食事	・通常通りです	・朝食は通常通りです。朝食終了後、絶飲食となります	<ul style="list-style-type: none"> 2時間後より水・お茶が飲めます 治療4時間後より吐き気などなければ夕食を食べれます。夕食はおにぎりになっております。 		
安静	・制限はありません	・制限はありませんが、なるべく病室で待機してしてください	<ul style="list-style-type: none"> ※治療後の安静は大変重要ですので、ご協力下さい 治療後2時間までは上を向いた姿勢で寝て下さい。 治療後2時間以降はベッド上で体の向きを変えられますが起き上がることはできません。 治療後4時間以降はベッドの背もたれをあげて座ることができます。座りたいときは必ずナースコールを押して看護師と一緒に起き上がるようにしてください 治療後6時間以降は歩行可能です 	・制限はありません	
排泄	・制限はありません	・尿の管を入れます		・制限はありません	
清潔	・入浴をしてください		・術後シャワー浴及び入浴は出来ません	熱がなければ創部を保護してシャワー浴が出来ます	
説明	<ul style="list-style-type: none"> 看護師よりオリエンテーションがあります タオル1枚・バスタオル2枚・T字帯もしくはオムツを準備してください 同意書を提出してください 	ご家族の方は来院をお願いします			

※これはあくまでも予定です。場合によっては予定通りにいかない事もありますので御了承ください。

福井県立病院 消化器内科 ラジオ波凝固焼却術(RFA) で入院された方へ 2017年12月改訂