






初めてリツキサン＋化学療法15日間で入院された方へ

患者番号：
患者氏名：

様

	入院日 /	入院2日目 /	入院3日目 /	入院4日目 /	入院5日目～入院8日目 / /	入院9日目 /	入院10日目～退院 /	
目標	治療の内容が理解できる	点滴が問題なく終了できる		日常生活の注意点がわかる 感染予防の対策についてわかる		点滴が問題なく終了できる	退院後の注意事項がわかる	
検査	・採血 ・胸部レントゲン ・心電図				リツキサン前日には採血があります		適宜採血があります	
治療		抗がん剤の点滴があります		白血球を上げる注射をします		リツキサンの点滴があります	熱が出た場合は、 抗生剤の点滴をします	
内服	持参薬があるときは 看護師に見せてください	プレドニンを5日間内服します イメンドを3日間内服します（患者さんによって服用しない場合もあります）					点滴前に副作用止めの内服薬があります	
食事	・特に制限はありません。何を食べていただいても結構です（制限がある方もいます）。 ・食欲がないときなどは、病院の食事を変更できます。看護師にご相談ください。							
感染予防	感染予防のために、うがい・手洗いなどに努めましょう。							
清潔	特に制限はありません。ただし、点滴日（入院2日目・9日目）に希望される方は、9時30分までにすませてください。							
学習	内服薬について	点滴漏れについて 過敏症について		便秘について 口内炎について	感染予防対策について			
						過敏症について	退院後の生活について	
説明	・治療前に薬剤師から説明があります。					治療中は血圧や体温をこまめに測定します		

※これはあくまでも予定です。場合によっては予定通りにいかない事もありますので御了承ください。 福井県立病院 血液腫瘍内科 初めてリツキサン＋化学療法15日間で入院された方へ