











人工股関節の手術を受けられる方へ






患者番号:
患者氏名:

様

日付	入院日～手術前日	/	/
目標	手術の予定や注意事項が理解できる。	(手術前) 予定通り入室できる。 (手術後) 術後の安静がとれる。痛みが軽減する。	ガーゼ汚染がない。 痛みが軽減する。
内服	<ul style="list-style-type: none"> 薬を服用している方はお申し出下さい。 入院後の内服は、医師に確認後、説明します。 	<ul style="list-style-type: none"> 内服は医師の指示で服用します。 	<ul style="list-style-type: none"> 必要に応じて痛み止めの内服が開始されます。
注射		<ul style="list-style-type: none"> 手術が午後の場合は午前中に500mlの点滴を1本します。 手術後は翌朝まで点滴をします。 痛い時は注射や坐薬を使用します。背中に管が入り持続的に痛み止めのお薬が入ったり、点滴から持続的に痛み止めのお薬が入る場合があります。 	<ul style="list-style-type: none"> 抗生剤の点滴があります。
検査			<ul style="list-style-type: none"> 早朝に採血があります。
処置	<ul style="list-style-type: none"> 弾性ストッキングのサイズの測定を行います。 	<ul style="list-style-type: none"> 手術後～翌朝まで酸素吸入をします。 手術後～翌朝まで心電図モニターをつけます。 手術後は時間毎に血圧などを測ります。 手術後、創部に管(ドレーン)が挿入されています。出血の量をみて輸血をすることがあります。 	<ul style="list-style-type: none"> ガーゼ交換(基本的には手術後2日目から)
食事	<ul style="list-style-type: none"> 手術当日()時からは何も食べないで下さい。()時以後は飲み物も飲まないで下さい。 ※指示までの時間に200～500mlの水かお茶を飲んで下さい。 	<ul style="list-style-type: none"> 何も食べたり飲んだりできません。 歯磨き、うがいはできます。 	<ul style="list-style-type: none"> 1日のみ粥食です。
安静	<ul style="list-style-type: none"> 特に制限はありません。 	<ul style="list-style-type: none"> 手術前に弾性ストッキング(血栓予防)を履きます。 手術後にフットポンプ(血栓予防)を装着します。 手術後は翌朝までベッド上安静です。 創部に管が入っていますので看護師がお手伝いして体の向きを換えます。 脱臼を予防するため股の間に枕を挟みます。 	<ul style="list-style-type: none"> ベッド上でリハビリが始まります。 <div data-bbox="1713 821 2139 933" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>私たちがお手伝いします ※上半身を少しずつ起こして 90°まで起きることができます。</p> </div> 
排泄	<ul style="list-style-type: none"> 前日のうちに排便は済ませておいてください。 下痢・便秘・生理が心配な方は早めにお申し出下さい。 	<ul style="list-style-type: none"> 手術前には必ずトイレを済ませてください。 手術後は尿量をチェックするために管が入っています。 便は便器で、寝たままします。 	<p>(便が出にくいときはお申し出下さい)</p>
清潔	<ul style="list-style-type: none"> シャワー又は入浴してください。 	<ul style="list-style-type: none"> 手術前に歯磨きをして下さい。 手術前に髭剃りをして下さい。 	<ul style="list-style-type: none"> 体を拭きます。
説明その他	<ul style="list-style-type: none"> 主治医より本人、家族に症状・手術の説明があります。 看護師から入院、手術の説明があります。 手術に必要な準備物の説明をします。 <div data-bbox="123 1252 683 1436" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>《手術の際に準備する物》 ※バスタオル 2枚 タオル 2枚 ※前開きのシャツ 必要に応じて ※オムツ 1枚ほど 尿取りパッド2枚ほど(病棟からご用意もできます)</p> </div> 	<ul style="list-style-type: none"> 手術中は原則としてご家族の方に院内でお待ちいただくようお願いしております。 手術後ご家族の方に主治医より手術の結果の説明があります。 手術時間が変更になることもありますので、ご家族の方は時間に余裕を持ってお越し下さい。 	<ul style="list-style-type: none"> 痛みに応じて足関節の運動や膝の屈伸運動を始めましょう。 苦痛症状や眠れないときは早めにお知らせください。 <p>*詳しくは看護師にお聞きください</p> 

※これはあくまでも予定です。場合によっては予定通りにいかないこともありますので、ご了承ください。

福井県立病院 整形外科 人工股関節の手術を受けられる方へ

日付	/ /	/ /	/ /
目標	痛みが軽減する。 介助のもとで車椅子に乗れる。	痛みが軽減する。 日常生活動作が自立する。	退院後の生活の注意点が分かる。
内服	・創部の管が抜去されると血栓予防の内服が始まります。	→ 10日間	
注射			
検査			
処置	・ガーゼ交換	・手術後10日前後に抜糸をします。	
食事			
安静	<ul style="list-style-type: none"> ・手術後2～3日頃に創に入っている管が抜ければ、車椅子に乗れます。(最初は看護師が介助、見守りします) ・リハビリ室へ行って、リハビリします。 ・脱臼予防のため内股にならないように気をつけましょう。  <p>起き上がる時期は人によって異なります。めまいや気分が悪い時は無理をしないで下さい。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・車椅子に自信がついたら徐々に病棟内から病院内へと行動範囲を広げましょう。 ・車椅子に自信がついたら、歩行器を使いましょう。 	<ul style="list-style-type: none"> ・歩行器に自信がついたら、杖を使いましょう。 
排泄	<ul style="list-style-type: none"> ・移動が慣れれば車椅子でトイレに行きます。(移動の状態をみて尿の管を抜きます) ・最初は看護師が付き添います。 		
清潔		<ul style="list-style-type: none"> ・医師の許可があればシャワーできます。 ・初めてのシャワーは看護師が一部お手伝いして行います。 	
説明 その他	<ul style="list-style-type: none"> ・車椅子への移乗は必ず看護師が付き添います。 	<ul style="list-style-type: none"> ・弾性ストッキングは指示があるまで履いて下さい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・1日も早いご回復をお祈り申し上げます。

※これはあくまでも予定です。場合によっては予定通りにいかないこともありますので、ご了承ください。

福井県立病院 整形外科 人工股関節の手術を受けられる方へ