


予定経皮的冠動脈治療(PCI)で入院された方へ

患者番号:
患者氏名:

様

| 日付 | 検査前日 | 検査当日 | | 翌日 | 2日目(退院日) |
|----|--|---|---|---|-----------------------------|
| | | 検査前 | 検査後 | | |
| 目標 | 治療予定がわかる 針を刺す部位がわかる 注意事項がわかる | 治療への不安なことが言える 注意事項が守られる | 胸部症状がない 異常な出血がない 針をさした部位の痛みや腫れがない | 胸部症状がない 異常な出血がない 針をさした部位の痛みや腫れがない | 胸部症状がない 針をさした部位の痛みや腫れがない |
| 内服 | 内服は続けてください 糖尿病薬は、医師より指示があります | | → | 内服が変更になる場合があります | |
| 注射 | ありません | 午前に治療の方は6時から点滴を開始します 午後に治療の方は10時頃から点滴を開始します | 点滴は、翌朝まで続きます | → 医師の診察後点滴を抜きます | |
| 検査 | 治療については、その都度説明します | | 心電図検査をします | 午前中に心電図検査をします | |
| 処置 | 医師の指示があった場合 両側の足のつけ根を除毛 します 午前中に治療の方は夕方に点滴の針を入れます | 治療は、()時からです 針は()より刺します | 心電図モニターを装着します 手から手術をされた場合 圧迫は、少しずつゆるめま | → 退院可能な方は、朝の診察時に外します 引き続き治療が必要な方は、心電図モニターを続けます | |
| 食事 | 心臓高血圧食です | 水分を300ml以上飲みましょう 午前の方は朝食は半量です 午後の方は昼は食事ができません | 水分は、すぐに飲めます 2時間たてば、食事ができます 夜は、おにぎり食です | 朝まで、おにぎり食です | |
| 安静 | 制限ありません | | 室内安静です 足からカテーテルされた方はベッド上安静です | 病棟内安静です | |
| 排泄 | 制限ありません | 必要な方に尿の管を入れます |  | 尿の管が入っている方は、医師の診察後に抜きます | |
| 清潔 | シャワーできます | シャワーできません |  | 夕方より軽くシャワーができます | シャワーできます |
| 説明 | 必要物品を確認します 別紙を参照してください | 家族の方は、治療30分前に来院し、病室でお待ちください 治療中はカテーテ室の前でお待ちください | 家族の方といっしょに、治療結果を聞いてください | 退院後の生活について説明があります | |

※これはあくまでも予定です。場合によっては予定通りにいかないこともありますので、ご了承ください。

福井県立病院 循環器内科 経皮的冠動脈治療(PCI)で入院された方へ